

Required BABY SHOTS by 5 years of age

DTaP					*4 th dose may be given as early as 12 months, but becomes required at 15 months of age.
Polio				*12 months	*3 rd dose may be given as early as 6 months, but becomes required at 12 months of age.
MMR					
Hib				*15 months	*Schedules may be for 3 and/or 4 doses depending on brand of Hib vaccine.. *4 th dose may be given as early as 12 months: becomes required at 15 months. *Complete with only one dose if given on/after 15 months.
Hep A					*Hep A vaccine is required in child care settings in Maricopa County.
Hep B					*May be given at birth, becomes required at 2 months. *3 rd dose may be given as early as 24 weeks, becomes required at 12 months. *4 th dose is needed if 3 rd dose is given before 24 weeks.
Varicella					*Parental recall of disease is accepted only for children who enrolled before 9/1/2011. All other children must have proof of immunization, a valid exemption for lab evidence of immunity, medical reasons or a conflict to religious beliefs.

<u>Vaccine</u>	<u>Prevents these diseases:</u>
<u>DTaP</u>	<u>Diphtheria</u> – Causes a severe throat infection that makes it very hard to swallow and breathe. <u>Tetanus (lockjaw)</u> – Causes severe muscle spasms, breathing and heart problems, and may lead to death. <u>Pertussis (whooping cough)</u> – Causes long spells of coughing. Very difficult for a child to eat, drink and breathe. Can lead to pneumonia, seizures and death.
<u>MMR</u>	<u>Polio</u> – Can cause lifelong paralysis and deformity. <u>Measles</u> – Causes a high fever, rash, sore eyes and cold-like symptoms. Can lead to hearing loss, swelling of the brain and spinal cord. Brain damage. <u>Mumps</u> – Causes headache, fever, and painful swelling of the cheeks and jaw. Can lead to hearing loss, swelling of the brain and spinal cord. Brain damage.
<u>Hib</u>	<u>Rubella (German measles)</u> - Highly contagious. Causes fever and rash on the face and neck. If pregnant, may compromise pregnancy or lead to birth defects.
<u>Hep A</u>	<u>Haemophilus influenza type B</u> – Causes joint, eye, ear, lung infections, other bacterial infections and meningitis. Can lead to brain damage and death.
<u>Hep B</u>	<u>Hepatitis A</u> – Severe liver disease that can cause flu-like symptoms, jaundice (yellow eyes or skin), severe stomach pains, diarrhea, and in rare cases – death.
<u>Varicella</u>	<u>Hepatitis B</u> – Serious liver infection that can lead to liver damage, liver cancer and in some cases – death. <u>Varicella (chicken pox)</u> – Highly contagious disease that causes fever, tiredness, and weakness followed by an itchy, blister-like rash over the body.

Requiere vacunas infantiles por cinco años de edad

DTaP					*4 ª dosis se puede administrar a los 12 meses, pero se requiere a los 15 meses de edad.
Polio				*12 meses	* 3 ª dosis se puede administrar tan pronto como 6 meses, pero se convierte en necesaria a los 12 meses de edad.
MMR					
Hib					* Los horarios pueden ser de 3 o 4 dosis dependiendo de la marca de la vacuna Hib. * 04 de mayo dosis se administra en los 12 meses: se requiere a los 15 meses. * Con una sola dosis si se administra en o después de 15 meses.
Hep A			*6 meses	*15 meses	* Existe una vacuna contra la hepatitis se requiere en los centros de atención infantil en el Condado de Maricopa solamente.
Hep B				*12 meses	* Puede ser dado en el nacimiento, se requiere a los 2 meses. * 3 ª dosis se puede administrar tan pronto como 24 semanas, se requiere a los 12 meses. * cuarta dosis es necesaria si la 3ra dosis se administra antes de las 24 semanas.
Varicella				*12 meses	*Los padres recuerdan de enfermedad es aceptada sólo para los niños matriculados antes de 9/1/2011. Todos los niños deben tener ya sea prueba de inmunización, exención válida para pruebas de laboratorio inmunidad, razones médicas o las creencias religiosas.

Vacuna Avuda Prevenir Estas Enfermedades:

DTaP **Diphtheria – Difteria** Causa una grave infección de garganta que hace que sea muy difícil de tragar y respirar.

Tetanus (lockjaw) – Tétanos Causa espasmos musculares severos para respirar, y problemas cardíacos, y puede conducir a la muerte.

Pertussis – Tos ferina Causa largos períodos de tos. Muy difícil para un niño a comer, beber y respirar. Puede conducir a neumonía, convulsiones y muerte.

Polio **Poliomielitis** - Puede causar parálisis permanente y la deformidad.

MMR **Measles - Sarampión** - Causa fiebre alta, erupción cutánea, dolor en los ojos y síntomas de un resfriado. Puede conducir a la pérdida de audición, inflamación del cerebro y la médula espinal. El daño cerebral.

Mumps - Paperas Provoca dolor de cabeza, fiebre e inflamación dolorosa de las mejillas y la mandíbula. Puede conducir a la pérdida de audición, inflamación del cerebro y la médula espinal. El daño cerebral.

Rubella - Rubéola Altamente contagiosa. Causa fiebre y erupción en la cara y el cuello. Si está embarazada, puede poner en peligro el embarazo o dar lugar a defectos de nacimiento.

Haemophilus influenzae tipo B Causas comunes del ojo, oído, infecciones pulmonares, otras infecciones bacterianas y la meningitis. Puede conducir a daño cerebral y muerte.

Enfermedad grave del hígado que puede causar síntomas parecidos a la gripe, ictericia (piel u ojos amarillos), fuertes dolores de estómago, diarrea, y en raros casos - la muerte.

Grave infección del hígado que puede conducir a daños en el hígado, cáncer de hígado y en algunos casos - la muerte.

Varicella **varicela** Enfermedad muy contagiosa que causa fiebre, cansancio y debilidad, seguidos por una erupción cutánea con picazón, ampollas en el cuerpo.